



# FICHA TÉCNICA VEGEX WHITE FLY



Fecha de revisión: 17/01/2020  
Versión: 00

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

**Nombre del producto:** VEGEX WHITE FLY

**Descripción:** Extracto de Torvisco + Extracto de Ruda + Extracto de Hoja Santa. INSECTICIDA AGRÍCOLA. CONCENTRADO SOLUBLE

## COMPOSICIÓN

**Ingrediente activo:**

Extracto de Torvisco ( <i>Daphne gnidium</i> ) Equivalente a 209.28g de i.a. / L a 20°C	20.00 % p/p
Extracto de Ruda ( <i>Ruta chalepensis</i> ) Equivalente a 209.28g de i.a. / L a 20°C	20.00 % p/p
Extracto de Hoja santa ( <i>piper auriantum</i> ) Equivalente a 104.64g de i.a. / L a 20°C	10.00 % p/p
<b>Ingredientes inertes:</b> Coadyuvante y diluyente	50.00 % p/p

**Total** ..... 100.00 % p/p

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Aspecto</b> .....	Líquido
<b>Color</b> .....	Naranja
<b>pH</b> .....	9.3 ± 1.0
<b>Densidad</b> .....	0.95 ± 0.05 g/cm3

## REGISTROS Y CERTIFICACIONES

Cofepris; Registro Sanitario de plaguicidas n° RSCO-MEZC-INAC-1106R-X0009-375-050  
Producto conforme a norma NOP. Certificado por SC CAAE.  
Certificado OMRI para uso orgánico



## DOSIS Y MODO DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL / L de agua)	OBSERVACIONES
Fresa, Arándano, Zarzamora, Grosella, Frambuesa, (SL)	Mosquita blanca (Bemisia tabaci)	4,0 - 8,0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos.
Jitomate, Papa, Tomate de cáscara, Berenjena, Chile, Chile Belli, (SL)		4,0 - 8,0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos.
Pepino, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía, Chayote, (SL)		6,0	Realizar una aplicación al follaje. Iniciar las aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos.
Manzano, Durazno, Peral, Membrillo, Albaricoque, Ciruelo, Cerezo, Almendro, (SL)		4,0 - 8,0	Realizar dos aplicaciones al follaje con intervalos de 7 días. Iniciar aplicaciones cuando sobre el cultivo se detecte la presencia de los primeros individuos.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: Una vez que seque el producto. **Intervalo de Seguridad:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** Sin Límite

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

**Envasado:** Botellas de 1 L (cajas 12 x 1L), garrafa de 5 (cajas 4 x 5L) garrafas 20 L, y contenedores de 1000 L. Leer bien la etiqueta antes de aplicar el producto, en ellas se detallan las especificaciones técnicas del producto, tales como riquezas garantizadas, propiedades, dosis y modo de empleo, aplicaciones y cultivos, registro, precauciones, normas de almacenamiento, incompatibilidades y notas del fabricante.

